

Oxitetraciclina 50 mg / ml

Solución
Inyectable

Uso Veterinario

Contenido neto 100 cm³
CPE0312245046

Cada ml. contiene:

| | | |
|---------------------|----|-------|
| Oxitetraciclina HCL | 50 | mg. |
| Excipientes c.s.p. | | 1 ml. |

Indicaciones:

Para el tratamiento y prevención de Enfermedades producidas por: Anaplasma sp, Rickettsia sp, Streptococcus sp, Clostridium sp, Escherichia coli, Pasteurella sp, Haemophilus sp, Leptospira sp, Listeria sp, Campylobacter sp, Bacteroides sp y Shigella sp. Tales enfermedades pueden ser: Anaplasmosis, neumonías, neumoenteritis, septicemia hemorrágica, diarrea de los terneros, metritis, casqueras, actinobacilosis, actinomicosis, micoplasmosis, queratoconjuntivitis, poliartritis, cólera porcina, enteritis bacteriana, leptospirosis, cólera aviar, sinusitis, coriza aviar, cresta azul y estafilococosis.

Inyéctese vía Intramuscular profunda o vía intravenosa lenta.

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:
1 - 2 ml/10Kg P.V. por 3 a 5 días.

Caninos, Felinos y Aves: 2 ml / 10 Kg P.V. por 3 a 5 días.

Esta dosis puede ser modificada por el Médico Veterinario.

Advertencias:

Retiro en carne 22 días. Retiro en leche 3 días.
Retiro en aves 5 días.

Almacenar en un lugar fresco y al abrigo de la luz.

Manténganse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

